

ウイルス・菌
除去

アルタント

ALTANT
オゾン化アルコール除菌剤

アルコール製剤に**オゾン**(O₃)を溶解させて、その**オゾン**(O₃)の酸化力により、ウイルス・菌を除去します。

特長

1. 幅広いウイルス・除菌に有効

2. ヒトにアルコール製剤並みの低刺激で安全

アルタント中のオゾン(O₃)は微量で、除菌作用後にO₂+Oに分解


(試験機関：日本食品分析センター)

3. 取り扱いが簡単・便利

- ・希釈調整が不要
- ・3年間効果持続

他の消毒剤との比較

殺菌力と安全性を模式的に示したものです。



国際特許、日本、米国、EU 他で特許を取得済

2018・11・09	国立感染症研究所と共同研究
2019・10・17	日本感染症学会で国立感染症研究所による学会発表
2020・02・14	日本環境感染学会で国立感染症研究所による学会発表
2020・03・30	防衛省への納入開始
2020・04・27	警視庁への納入開始
2020・05	国立感染症研究所 花岡先生による論文公開予定 (タイトル：オゾン化アルコール除菌剤“アルタント”の抗アデノウイルス活用の評価)



用途

診療台ユニット・イス・ドアノブ・テーブル・ストレッチャー・手すり・トイレ・便座・エレベーターボタン・食器・マスク
白衣・作業衣・厨房・介護用品・汚物処理後等の除菌・消臭。

使用方法

ウイルス・菌の付着が気になる場所や対象物に約20センチ以上離してまんべんなく噴霧して下さい。
噴霧後拭きとるか、必要に応じて約5分以上放置して下さい。

使用上の注意

- 容器をよく振ってからご使用下さい。
- 換気の良いところでご使用下さい。
- 換気をしているところでも、アルコール臭が無くなってから入室して下さい。
- 飲用しないで下さい。
- アルコール過敏症の方は使用しないで下さい。
- 他の製品との併用は絶対にしないで下さい。
- 人体、動物に直接使用しないで下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 立てて冷暗所（40℃以上にならないところ）に保管して下さい（天地無用）。
- 小児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 開封後は6ヶ月以内に使いきって下さい。
- 使用期限3年をお守り下さい。
- 一部の部材（金属（未塗装の鋼材、銅、真ちゅう）、樹脂（アクリル、ABS）、天然ゴム等）、精密機器、白木や桐の家具、皮革類、毛皮、貴金属、金箔・絹製品、和装品、漆器、大理石等には使用しないで下さい。
- 使用中または使用後に、悪心、咳込み、皮膚や目の違和感が現れた場合は使用を中止して下さい。
症状が残る場合は医師に相談して下さい。
- 食品など口に含んだりするものには使用しないで下さい。
- 希釈して使用しないで下さい。
- 使用環境により、においが変化することがありますが、効果に影響はありません。

応急処置

- 万一火災が発生した場合は、アルコール用消火器で消して下さい。
- 万一目に入った場合はこすらず、大量の水で洗い流し、医師に相談して下さい。

内容成分

イソプロピルアルコール、イソパラフィン、オゾン（O₃）

発売元 株式会社 E テック

本社・医療機器開発研究所
〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地
神戸医療産業都市内KIO316号室
TEL:078-335-5425 FAX:078-335-5426

第二研究所
〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2

工場
〒652-0884 神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25 D棟218B室
URL:<http://www.e-teck.co.jp/>

お問い合わせ先